

# CGM huisarts Oproepen

Figuur 1

Sinds kort is het mogelijk om in 'Oproepen' meteen de laatst ingevulde meetwaarde te zien door bij het uitvoeren van een oproep een vinkje te zetten, zoals in het scherm in figuur 1. Let wel: het gaat hierbij om de meetwaarde van de allerjongste datum. Wat is nu de kracht daarvan?

In een eerder nummer heb ik in


T&T beschreven hoe u bij controles in de meetwaardenmodule ondersteuning kunt regelen, bijvoorbeeld op een 'eigen' meetwaarde als 'Afwijkend onderzoek'.

Hiertoe moest u een meting aanmaken in 'Metingen', als module te vinden onder het bovenbalkmenu 'Onderzoeken'. Ik gaf toen aan dat u deze meetwaarde tel-

kens moet aanpassen als de status van afhandeling is gewijzigd.

Is het getal voor afwijkend 1 en voor afgehandeld 2, dan moet u dat eerste ingevoerde getal 1 altijd wijzigen in 2.

Dankzij deze extra mogelijkheid en door bij het uitvoeren van een oproep de optie 'Selecteer alleen laatst ingevulde meetwaarde' aan



Figuur 2

te vinken (zie figuur 1), hoeft u die wijziging niet meer door te voeren.

Het is nu immers mogelijk om een oproep te maken voor de meetwaarde 'Afwijkend onderzoek', die alleen patiënten selecteert bij wie de meting is geregistreerd tussen de begindatum en einddatum, en bij wie de laatst ingevulde waarde 1 is. Bij het maken van de oproep hoeft u dan alleen te kijken naar de bewuste meting en de waarde tussen 1 en 1, die moet voorkomen (zie figuur 2).

Als u een oproep uitvoert, moet u de geldende periode (begin- en einddatum) invoeren en een vinkje zetten bij 'Selecteer alleen laatst ingevulde meetwaarde'. De gevraagde lijst is dan binnen twee tellen gemaakt. Vergeet u het vink-

je, dan wordt de lijst natuurlijk onnodig groot. Zet u het vinkje vervolgens alsnog en klik op 'Uitvoeren', dan is de lijst snel weer op orde.

De voordelen zijn duidelijk: een eenvoudige registratie en rapportage. Alleen bij het constateren van een afwijkend resultaat moet u een meetwaarde met 1 registreren en met het afhandelen van de afwijking zelf een 2.

U kunt de oproep voor de hele populatie van de praktijk laten gelden, maar kunt deze ook laten uitvoeren over een andere selectie, die u eerder hebt gemaakt en opgeslagen. U selecteert bijvoorbeeld eerst alle patiënten met diabetes mellitus type 2 en slaat deze op. Daarna selecteert u over deze selectie alle gevallen waarbij een

afwijkend onderzoek niet is afgehandeld.

Er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Zo kunt u ook een meetwaarde maken in het kader van andere vormen van logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld van de POH bij COPD-enquêtes. Voor de vereiste stappen in dat kader kan het nodig zijn om voor elke stap meer getallen te bedenken.

**RENÉ VAN LEEUWEN**  
RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL