



Promedico VDF Gebruikerservaring: een vrouw met een urineweginfectie



Figuur 1. Zodra u een episodenaam met ICPC-code invoert, krijgt u een waarschuwing wanneer er al een episode bestaat.



Figuur 2. De waarschuwing voor een gesloten, opnieuw te openen episode



Figuur 3. Een van de opties om urineonderzoek vast te leggen in de meetwaarden

Voor deze tip en truc is gekozen voor een casus: een 35-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis diabetes mellitus type 2. Op dit moment heeft ze klachten van een urineweginfectie. Drie jaar geleden maakte ze ook een urineweginfectie door en ze heeft een geneesmiddelovergevoeligheid voor nitrofurantoïne.

In Promedico VDF start u eerst het deelcontact op. Op het moment dat u een episode op de E-regel

kiest, waarschuwt het systeem dat er al een episode is met dezelfde ICPC-code (zie figuur 1). Wanneer u voor de bekende episode kiest, komt er een extra waarschuwing omdat deze episode al was gesloten. Vervolgens krijgt u de vraag of deze gesloten episode opnieuw geopend moet worden (zie figuur 2). U kunt voor de eerdere episode kiezen of voor dit nieuwe probleem toch een nieuwe episode aanmaken. Na het invoeren van de

episode kunt u de uitslag van het urineonderzoek makkelijk vastleggen. Door met de rechtermuisknop op de O-regel te klikken opent u een scherm met onderzoeken die passen bij de gekozen episode. Het urineonderzoek is voor dit moment de juiste keuze (zie figuur 3). Voor het kiezen van de beschikbare therapie opent u Prescriptor via een rechtermuisknopklik in het p-regelvak. Dan wordt het volgende scherm zichtbaar (zie figuur 4).

U71 - Cystitis/urinewegsinfectie

Indicaties (1) Verbergen ▾

- Urinewegsinfecties - NHG Rx

Therapie schema's (10) Tonen ▾

- Cystitis bij vrouw met diabetes mellitus, verminderde weerstand of afwijking aan nieren/urinewegen: Stap 1: antimicrobieel middel

Therapie clusters (4) **Eigen keuze**

Niet-medicamenteuze adviezen: nitrofurantoinen, fosfomycine, trimethoprim

Alert: R/I d. S.

FOSFOMYCINE GRANULAAT 3G 1 ST eenmalig 1 sachet voor het slapen en na legen van de blaas

Figuur 4. Een overzicht van Prescriptor

Memocode FOSFP3 **Product omschrijving** FOSFOMYCINE GRANULAAT 3G **Farmacotherapeutisch kompas** Product

Dosering -E1SA VS **Duur** 1 Dagen

Gebruiksvoorschrift
eenmalig 1 sachet voor het slapen en na legen van de blaas

Hoeveelheid 1 ST **Gebruiksperiode** 14-09-2022 - 14-09-2022 **Iteraties** 0 Jaarrecept Continue

Episode: Cystitis (U71.01) **Verstrekken via** Eigen Apotheek

Soort Relevantie Melding/Afhandeling

- Af te handelen: 0
- Afgehandeld: 0
- Niet relevant: 0
- Alle meldingen: 0
- MFB Uitgevoerd: 1

Figuur 5. Het juiste voorschrift geladen door Prescriptor

Na de keuze voor het juiste therapieschema kunt u op de groene plus aan het eind van de regel in Prescriptor klikken en terugkeren naar Promedico VDF. Daar komen

we dan in het voorschriftenschermbaar, waar alles van onze keuze in Prescriptor al is ingevuld (zie figuur 5). In de linker kolom is een eventuele medisch farmaceutische beslisregel

afgehandeld en zichtbaar. Daarna kunt u het voorschrift op de gebruikelijke wijze afhandelen, zodat de apotheek het kan verstrekken. Als bovenstaande casus over een meisje van zeven jaar zou gaan, dan volgt in het voorschriftenschermbaar een waarschuwing voor gewichtscntrole (zie figuur 6). Het gewicht is dan tijdens het voorschrijven in te voeren. Ook dan kunt u het voorschrift op de normale manier afhandelen.

De communicatie vanuit de doktersassistente, die het probleem van de urinewegsinfectie vaak zelfstandig afhandelt, verloopt volledig via de assistentemodule. U kunt ervoor kiezen om het probleem zelf verder af te handelen of een antwoord naar de assistente sturen. Wanneer de assistente het deelcontact zelfstandig afhandelt, volgt automatisch een bericht in de deelcontactautorisatie, zodat u kunt zien en aftekenen wat er geregeld is. Via e-consult kunt u een bericht voor de patiënt naar het portaal van de patiënt sturen. De praktijk leert dat deze hulpvraag vaak telefonisch of aan de balie wordt afgehandeld. Zeker in de apotheekhoudende praktijken wordt medicatie vaak direct verstrekt.

HANNEKE TAN
HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL

Patient: 16103 (P) | C. Test (vrouw 7 jaar) | Vrouw | 01-01-2010 (12) | BSN: 000000000 | **R/ FOSFOMYCINE GRANULAAT 3G 1D1SA**

Voorschrift Verstrekking

Voorschrijver Dieleman **Plaatsnaam** Hoenderloot **Agbcode** 01025135 **Specialisme** Huisarts, Apotheekhoudend **VkCode** 0110

Memocode FOSFP3 **Product omschrijving** FOSFOMYCINE GRANULAAT 3G **Farmacotherapeutisch kompas** Product **Kinderformulier** Handelsproduct Artikel

Dosering 1D1SA **Duur** Dagen

Gebruiksvoorschrift
1 maal per dag 1 sachet.

Hoeveelheid ST **Gebruiksperiode** 14-09-2022 - - **Iteraties** - Jaarrecept Continue

Episode: - **Verstrekken via** Eigen Apotheek

Bepaling **Uitslag** **Eenheid** **dd.**

Gewicht invullen... (klik in uitslag)
Lengte invullen... (klik in uitslag)
eGFR (CKDE) invullen... (klik in uitslag)
eGFR (MDRD) invullen... (klik in uitslag)

Doseringcontrole:

Norm: Max 1 (per keer)
Norm: Min 0.887 (per keer)

Soort Relevantie Melding/Afhandeling

Dosering **Ernstig** Geen doseringscontrole: onbekend actueel gewicht!

Gezien **ZRS** **Medew** **Datum** **Toe...**

iv.v. Hanneke 14-sep-22 21:46

Figuur 6. Medicatiebewakingscontrole op gewicht